



### Consentimento Informado para Doação de menores de 18 anos

Eu, \_\_\_\_\_, identidade n° \_\_\_\_\_, responsável legal por \_\_\_\_\_, identidade n° \_\_\_\_\_ autorizo que o mesmo realize doação de sangue na data de hoje.

Declaro estar ciente que:

1º) Autorizo que o Menor de idade acima realize uma doação de sangue, sendo submetido às mesmas exigências e responsabilidades previstas aos demais doadores de sangue, como Triagem Clínica, Coleta, assim como realizar e receber os resultados dos exames imunohematológicos e sorológicos, com a preservação do sigilo de todas as etapas acima referenciadas.

2º) Estou ciente que o sangue, obtido durante a doação, será submetido às mesmas etapas e aos mesmos exames sorológicos e imunohematológicos realizados nas demais doações. Este será testado para HIV e para outros marcadores de doenças (Hepatite B, Hepatite C, Doença de Chagas, Sífilis e HTLV) e podem apresentar resultados falso-positivos. Entendo que os exames realizados no banco de sangue são exames de triagem e não de diagnóstico, portanto os resultados não-negativos não são conclusivos, uma vez que diversos fatores podem alterar os resultados dos exames realizados no sangue doado (que tem por fim a maior proteção do receptor).

3º) No caso de resultado sorológico alterado, o doador será chamado para coleta de nova amostra, repetição e confirmação do resultado e/ou entrega de laudo e orientações. Declaro estar ciente que estes resultados e as orientações pertinentes poderão ser entregues somente ao respectivo doador, não sendo permitida a entrega a terceiros, nem aos seus responsáveis legais, como prevê a Portaria n° 158/2016 do MS.

4º) No processo de investigação sorológica, o(a) doador(a) poderá ficar inapto(a) a doação de sangue até a conclusão da investigação. Caso o sangue apresente resultado POSITIVO ou DUVIDOSO (INCONCLUSIVO ou INDETERMINADO), o sangue coletado não será utilizado e o seu nome será incluído em uma listagem de doadores inaptos da Secretaria Estadual de Saúde.

4º) Durante a coleta do sangue podem aparecer reações colaterais como náuseas, queda da pressão arterial, tontura, entre outros menos frequentes.

DECLARO NESTA DATA QUE ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES EXPOSTAS ACIMA.

Curitiba, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Doador

\_\_\_\_\_  
Autorização do Responsável legal